


AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

Départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne



Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

62, avenue Nationale - La Neuville
B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Téléphone : (26) 09.06.43

PUBLICATION PÉRIODIQUE
Abonnement annuel : F
Régisseur de Recettes D D A Marne
C.C.P. Châlons-sur-Marne 2800-67 W

ÉDITION GÉNÉRALE - GRANDES CULTURES

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

BULLETIN N° 25 du 22 AOÛT 1985

Envoi n° 23

Abonnement annuel :

Edition A ou B : 125 F

Edition A + B : 225 F.

POMME DE TERRE	: AGIR	MILDIOU
LUZERNE	: AGIR	SITONES
BETTERAVES	: SURVEILLER	MALADIES FOLIAIRES

POMME DE TERRE

Mildiou :

Les pluies fréquentes provoquent de nouvelles contaminations.

Les sorties de taches se succèdent rapidement.

LES TRAITEMENTS NE SE JUSTIFIENT PLUS POUR LES PARCELLES QUI SERONT ARRACHÉES PROCHAINEMENT. DANS TOUTES LES AUTRES SITUATIONS, CONTINUER D'ASSURER UNE COUVERTURE PERMANENTE DES CULTURES. EN CAS DE LESSIVAGE, INTERVENIR DE PRÉFÉRENCE AVEC UN PRODUIT PÉNÉTRANT. LA SITUATION RESTE TRÈS CRITIQUE. TOUT RELÂCHEMENT DANS LA PROTECTION POURRAIT COMPROMETTRE LA RÉCOLTE.

LUZERNE DE SEMIS

Sitones :

Des attaques importantes de sitones sont toujours enregistrées. Les dégâts causés ont parfois même conduit à des resemis.

VISITER VOS PARCELLES RÉGULIÈREMENT CAR LES RE-INFESTATIONS PEUVENT ÊTRE TRÈS RAPIDES, NOTAMMENT APRÈS DES APPLICATIONS D'INSECTICIDES À REMANENCE FAIBLE.

BETTERAVES

Maladies foliaires :

Les symptômes sont toujours très rares, même dans les parcelles n'ayant pas encore reçu de protection.

UNE INTERVENTION NE SE JUSTIFIE QUE DANS LES PARCELLES QUI SERONT ARRACHÉES TARDIVEMENT APRÈS OBSERVATION DE SYMPTÔMES.

LES MALADIES CRYPTOLOGAMIQUES du FEUILLAGE de la BETTERAVE

Quatre maladies cryptogamiques ont fait l'objet d'interventions phytosanitaires régulières.

L'OIDIUM

Ce champignon se caractérise par une aptitude à germer en conditions particulièrement sèches. Les conditions d'apparition et de développement sont principalement liées à la température.

La meilleure période d'intervention est celle où l'on constate les tout premiers symptômes (stade "étoile"). Les interventions plus tardives peuvent présenter une efficacité plus réduite.

CERCOSPORIOSE

Elle est localement grave, particulièrement en secteur de vallée et en culture irriguée où chaleur et humidité sont suffisantes.

Dans ces situations, l'intervention doit se faire aux premiers symptômes.

Des cas de résistance aux BMC ayant été décelés, l'alternance des matières actives apparaît donc nécessaire.

RAMULARIOSE

Les conditions de développement de cette maladie, ainsi que sa nuisibilité, sont encore mal connues.

La ramulariose se développe tardivement.

L'efficacité de traitements est très irrégulière. Cette irrégularité est essentiellement liée au "placement" des traitements.


ROUILLE

Cette maladie de fin de saison connaît depuis quelques années un développement important.

En 1985, des augmentations de rendement "sucre" de 10 % ont été notées dans un essai SPV (25 % de surface foliaire couverte avant récolte).

En dehors des spécialités homologuées sur cette maladie, Corvet CM et Dithane, on a pu noter dans les essais SPV l'efficacité intéressante de Rimidine, et à un moindre degré de Bayleton 25 et Topsuc aux doses homologuées sur les autres maladies.

CERCOSPORIOSE



RAMULARIOSE

